

Arboretum - Heempark Delft

Bomen & struiken

Wetenschappelijke namen en tekst

A

Abies cephalonica - Griekse zilverspar - mei - Griekenland - Ingevoerd in 1824, Engeland - Pinaceae

Abies concolor - Colorado zilverspar - mei - Westen van de VS - Ingevoerd in 1851, Engeland - Pinaceae

Abies koreana - Zilverspar - mei - Korea - Ingevoerd in 1905, Frankrijk - Pinaceae

Abies nordmanniana - Nordmannspar - mei - Kaukasus, Klein-Azië - Ingevoerd in 1840, Engeland - Pinaceae

Acer campestre - Spaanse aak / Veldesdoorn - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Sapindaceae

Acer cissifolium - Esdoorn - mei - Japan - Ingevoerd in 1860, Nederland - Sapindaceae

Acer negundo - Vederesdoorn - maart - april - Midden en oosten van Noord-Amerika - In cultuur - sinds 1688, Engeland - Sapindaceae

Acer palmatum - Japanse esdoorn - mei - Japan, Korea - Ingevoerd in 1832, Engeland - Sapindaceae

Acer platanoides - Noorse esdoorn - april - mei - Europa, Kaukasus - Lang in cultuur - Sapindaceae

Acer pseudoplatanus - Gewone esdoorn - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Sapindaceae

Acer saccharinum - Witte esdoorn - maart - april - Midden en oosten van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1725, Engeland - Sapindaceae

Acer tataricum - Esdoorn - voorjaar - Zuidoosten van Europa, westen van Azië - In cultuur sinds 1759 - Sapindaceae

Aesculus hippocastanum - Witte paardenkastanje - mei - Balkan - Ingevoerd in 1557 - Sapindaceae

Aesculus parviflora - Herfstpaardenkastanje - juli - augustus - Zuidoosten van de VS - Ingevoerd in 1786, Engeland - Sapindaceae

Aesculus x carnea - Rode paardenkastanje - (*A. hippocastanum* x *A. pavia*) - mei - Ontstaan +- 1888, Frankrijk - Sapindaceae

Ailanthus altissima - Hemelboom - juni - juli - China - Ingevoerd rond 1750, Frankrijk - Simaroubaceae

Akebia quinata - mei - juni - Oosten van Azië - Ingevoerd in 1845, Engeland - Lardizabalaceae

Alnus cordata - Hartbladige els - maart - april - Italië, Corsica, Kaukasus - In cultuur sinds 1815, Frankrijk - Betulaceae

Alnus glutinosa - Zwarte els - januari - maart - Europa, Kaukasus, Siberië - Lang in cultuur - Betulaceae

Alnus incana - Witte els / Grauwe els - januari - maart - Europa, West-Azië, Noord-Amerika - In cultuur sinds 1780, Engeland - Betulaceae

Amelanchier lamarckii - Drents krentenboompje - april - mei - Oosten van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1781, Duitsland - Rosaceae

Aralia elata - (Duivelswandelstok) - juli - september - Oosten van Azië - Ingevoerd in 1859, Rusland

Aucuba japonica 'Variegata' - maart - april - Cultivar, ingevoerd in 1783, Engeland - (De soort: Japan, ingevoerd in 1856, Nederland) - Garryaceae

B

Berberis (x mentorensis) - Zuurbes - (*B. julianae* x *B. thunbergii*) - mei - Ontstaan in 1925, VS - Berberidaceae

Berberis aggregata - Zuurbes - mei - juni - Westen van China - Ingevoerd in 1903, Engeland - Berberidaceae

Berberis gagnepainii - Zuurbes - mei - juni - Westen van China - Ingevoerd in 1904, Engeland - Berberidaceae

Berberis julianae - Zuurbes - mei - juni - Midden van China - Ingevoerd in 1900, Engeland - Berberidaceae

Berberis koreana - Zuurbes - mei - juni - Korea - Ingevoerd in 1905, Engeland - Berberidaceae

Berberis pratti - Zuurbes - juni - juli - Westen van China - Ingevoerd in 1904, Engeland - Berberidaceae

Berberis thunbergii - Zuurbes - mei - Japan - Ingevoerd in 1860, Nederland - Berberidaceae

Berberis verruculosa - Zuurbes - mei - juni - Westen van China - Ingevoerd in 1904, Engeland - Berberidaceae

Berberis vulgaris - Zuurbes - mei - Europa - In cultuur sinds 1594, Nederland - Berberidaceae

Berberis x media - Zuurbes - (*B. hybrido-gagnepainii* 'Chenaultii' x *B. thunbergii*) - mei - juni - Ontstaan +- 1950, Boskoop - Berberidaceae

Berberis x stenophylla - Zuurbes - (*B. darwinii* x *B. empetrifolia*) - mei - Ontstaan rond 1860, Engeland - Berberidaceae

Berijpte wilg - *Salix daphnoides* - maart - april - Europa, Azië - In cultuur sinds 1796, Duitsland - Salicaceae

Betula nigra - Zwarte berk - maart - april - Oosten en midden van de VS - In cultuur sinds 1736, Engeland - Betulaceae

Betula papyrifera - Papierberk - april - mei - Noord-Amerika - Lang in cultuur - Betulaceae

Betula pendula - Ruwe berk - april - Europa, Klein-Azië - Lang in cultuur - Betulaceae

Betula pendula 'Purpurea' - Ruwe berk - april - Europa, Klein-Azië - Cultivar, ontstaan rond 1870, Frankrijk - (De soort: Europa, Klein-Azië) - Betulaceae

Betula pubescens - Zachte berk - april - mei - Europa, noorden van Azië - Lang in cultuur - Betulaceae

Broussonetia papyrifera (vrouw) - Papiermoerbeiboom - mei - China, Japan - In cultuur sinds 1884, Engeland - Moraceae

Buddleja alternifolia - Vlinderstruik - juni - Noordwesten van China - Ingevoerd in 1914, Engeland - Scrophulariaceae

C

Callicarpa bodinieri var. *giraldii* 'Profusion' - Schoonvrucht - juni - juli - Cultivar, een vondst +- 1958, Nederland - (De soort: China) - Lamiaceae

Caragana arborescens - Erwtenstruik - mei - Siberië, Mantsjoerije - In cultuur sinds 1748, Zweden - Fabaceae

Carpinus betulus - Gewone haagbeuk - april - mei - Europa, West-Azië - Lang in cultuur - Betulaceae

Carpinus betulus 'Fastigiata' - Gewone haagbeuk - april - mei - In cultuur sinds 1876, Duitsland - (De soort: Europa, westen van Azië) - Betulaceae

Castanea sativa - Tamme kastanje - juni - juli - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Fagaceae

Catalpa ovata - Trompetboom - juli - augustus - China - Ingevoerd in 1849, Nederland - Bignoniaceae

Ceanothus x delilianus 'Gloire de Versailles' - (*C. caeruleus* x *C. americanus*) - juni - oktober - In cultuur voor 1830 - Rhamnaceae

Cedrus atlantica - Ceder - september - oktober - Atlasgebergte - Ingevoerd in 1839, Frankrijk - Pinaceae

Cedrus deodara - Himalayaceder - september - oktober - Westen van de Himalaya - Ingevoerd in 1822, Engeland - Pinaceae

Celtis australis - Europese netelboom - april - mei - Middellandse Zee - In cultuur sinds 1596, Engeland - Cannabaceae

Cephalanthus occidentalis - Kogelbloem - juli - augustus - Noord-Amerika - Ingevoerd in 1735, Engeland - Rubiaceae

Cercidiphyllum japonicum - Katsoeraboom (Hartjesboom) - mei - Oosten van Azië - Ingevoerd in 1865, VS - Cercidiphyllaceae

Cercis siliquastrum - Judasboom - april - mei - Middellandse Zee - In cultuur sinds de Oudheid - Fabaceae

Clematis vitalba - Bosrank - juli - September - Europa, Middellandse Zee - In cultuur sinds de 16^e eeuw - Ranunculaceae

Colutea x media - Blazenstruik - (*C. arborescens* x *C. orientalis*) - mei - september - In cultuur sinds 1623, Frankrijk - Fabaceae

Cornus alba - Witte kornoelje - mei - juni - Oosten van Europa, noorden van Azië - In cultuur sinds 1741, Engeland - Cornaceae

Cornus kousa (cultivar) - Kornoelje - mei - juni - Japan, Korea - Ingevoerd in 1860, Nederland - Cornaceae

Cornus mas - Gele kornoelje - februari - maart - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Cornaceae

Cornus sanguinea - Rode kornoelje - mei - juli - Europa - Lang in cultuur - Cornaceae

Cornus stolonifera 'Flaviramea' - Kornoelje - mei - juli - Cultivar, sinds 1899, Duitsland - (De soort: midden en oosten van Noord-Amerika) - Cornaceae

Corylopsis pauciflora - Schijnhazelaar - maart - april - Japan - Ingevoerd in 1860, Rusland - Hamamelidaceae

Corylopsis spicata - Schijnhazelaar - maart - april - Japan - Ingevoerd in 1856, Nederland - Hamamelidaceae

Corylus avellana - Gewone hazelaar - jan - maart - Europa, Middellandse Zee - In cultuur sinds de Oudheid - Betulaceae

Corylus colurna - Boomhazelaar - februari - maart - Balkan - Ingevoerd in 1586, Oostenrijk - Betulaceae

Corylus maxima 'Purpurea' - Lambertsnoot - januari - maart - cultivar, sinds 1759, Engeland - (De soort: zuidoosten van Europa, westen van Azië) - Betulaceae

Cotinus coggygria - Pruikenboom - juni - juli - Zuiden van Europa tot in China - In cultuur sinds 1594, Nederland - Anacardiaceae

Cotoneaster - serie *Conspicui* - Dwergmispel - mei - juni - China, Tibet, Nepal, Bhutan - Rosaceae

Cotoneaster - serie *Dielsiani* - Dwergmispel - mei - juli - China - Rosaceae

Cotoneaster - serie *Franchetoides* - Dwergmispel - juni - juli (- augustus) - China, Tibet - Rosaceae

Cotoneaster - serie *Horizontales* - Dwergmispel - mei - juni - Westen van China - Ingevoerd in 1877, Frankrijk - Rosaceae

Cotoneaster - serie Radicantes - Dwergmispel - mei - juni - China - Roseae

Cotoneaster (apiculatus) - Dwergmispel - mei - juni - Westen van China - Ingevoerd in 1910, VS - Rosaceae

Cotoneaster (franchetti) - Dwergmispel - juni - juli - Westen van China - Ingevoerd in 1889, Frankrijk - Rosaceae

Cotoneaster dammeri - Dwergmispel - mei - Midden van China - Ingevoerd in 1900, Engeland - Rosaceae

Cotoneaster salicifolius 'Willeke' - Dwergmispel - juni - Cultivar, introductie 20e eeuw, Nederland - (De soort: westen van China, Tibet) - Rosaceae

Crataegus monogyna - Eenstijlige meidoorn - mei - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Rosaceae

Crataegus x grignonensis - Meidoorn - (C. crus-galli x C. pubescens) - mei - juni - In cultuur sinds 1873, Frankrijk - Rosaceae

Crataegus x prunifolia - Meidoorn - (C. crus-galli x C. macracantha) - mei - In cultuur sinds 1783, Duitsland - Rosaceae

Cydonia oblonga - Kweeper - mei - Midden van Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

Chaenomeles japonica - Dwergkwee - maart-april - Japan - Ingevoerd in 1869, Engeland - Rosaceae

Chaenomeles speciosa - Dwergkwee - maart - april - China - Ingevoerd in 1778, Nederland - Rosaceae

Chamaecyparis lawsoniana - Californische cypres - maart - april - Noordwesten van de VS - Ingevoerd in 1854, Engeland - Cupressaceae

Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' - Californische cypres - maart - april - Cultivar, ontstaan rond 1920, Engeland - (De soort: noordwesten van de VS) - Cupressaceae

Chamaecyparis lawsoniana 'Stewartii' - Californische cypres - maart - april - Ontstaan rond 1900, Engeland - (De soort: Noordwesten van de VS) - Cupressaceae

Chamaecyparis pisifera 'Filifera' - Japanse cypres - maart - april - Cultivar in 1861 ingevoerd, Engeland - (De soort: Japan) - Cupressaceae

D

Deutzia gracilis - Bruidsbloem - mei - Japan - Ingevoerd in 1829, Nederland - Hydrangeaceae

Deutzia scabra - Bruidsbloem - juni - juli - China, Japan - Ingevoerd in 1833, Engeland - Hydrangeaceae

Deutzia x rosea - Bruidsbloem - (D. gracilis x D. purpurascens) - +- 1895, Frankrijk - Hydrangeaceae

E

Elaeagnus x ebbingei - Olijfwilg - (E. macrophylla x E. pungens) - oktober - november - Japan - Kruising ontstaan in 1927, Nederland, Den Haag - Elaeagnaceae

Eleutherococcus sieboldianus - juni - juli - Japan - Ingevoerd in 1856, Nederland - Araliaceae

Escallonia ('Donard Seedling') - (Escallonia rubra (var. macrantha) x Escallonia virgata) - juni - juli - Introductie na 1904, Noord-Ierland - Escalloniaceae

Euonymus alatus - Kardinaalshoed - mei - juni - Oosten van Azië - Ingevoerd 1856, Nederland - Celastraceae

Euonymus europaeus - Gewone kardinaalshoed - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Celastraceae

Exochorda racemosa - Parelstruik - mei - Oosten van China - Ingevoerd in 1849, Engeland - Rosaceae

F

Fagus sylvatica - Gewone beuk - mei - Europa - Lang in cultuur - Fagaceae

Fagus sylvatica 'Atropunicea' - Bruine beuk - mei - Cultivar, eind 19e eeuw - (De soort: Europa) - Fagaceae

Forsythia x intermedia - Chinees klokje - (*F. suspensa* x *F. viridissima*) - april - Ontstaan in 1889, Duitsland - Oleaceae

Frangula alnus - Gewone vuilboom - juni - augustus - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Rhamnaceae

Fraxinus excelsior - Gewone es - mei - Europa - Lang in cultuur - Fagaceae

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' - Gewone es - april - Vondst, 1947, Nederland - (De soort: Europa, westen van Azië) - Oleaceae

Fraxinus ornus - Pluimes - mei - juni - Zuiden van Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Oleaceae

G

Ginkgo biloba - Japanse notenboom - april - mei - China - Ingevoerd rond 1770, Nederland - Ginkgoaceae

Gleditsia triacanthos - Valse Christusdoorn - juni - juli - Westen en midden van de VS - In cultuur 1700, Engeland - Fabaceae

H

Halimodendron halodendron - Zoutstruik - juni - juli - Westen van Azië tot Altaigebergte - Ingevoerd in 1779 - Fabaceae

Hamamelis japonica - Japanse toverhazelaar - januari - maart - Japan - Ingevoerd in 1859, Nederland - Hamamelidaceae

Hamamelis mollis - Toverhazelaar - december - maart - Midden van China - Ingevoerd in 1879, Engeland - Hamamelidaceae

Hamamelis virginiana - Amerikaanse toverhazelaar - september - oktober - Midden en oosten van de VS - Ingevoerd in 1737, Engeland - Hamamelidaceae

Hibiscus syriacus - Althaeastruik - juli - september - China, India (niet in het wild) - In cultuur sinds 1596, Engeland - Malvaceae

Hydrangea anomala subsp. *petiolaris* - (Klimhortensia) - juni - juli - Oosten van Azië - Ingevoerd in 1878, Engeland - Hydrangeaceae

Hydrangea paniculata - (Pluimhortensia) - juli - september - China, Japan - Ingevoerd in 1856, Nederland - Hydrangeaceae

I

Ilex aquifolium (man) - Scherpe hulst / Groene hulst - mei - juni - Europa, westen van Azië - In cultuur sinds de Oudheid - Aquifoliaceae

Ilex crenata - Japanse hulst - mei - juni - Japan - Ingevoerd in 1860, Nederland - Aquifoliaceae

Indigofera heterantha - Indigostruik - juli - september - Himalaya - In cultuur sinds 1840, Engeland - Fabaceae

Itea virginica - Bloemwilg - mei - juni - Oosten van de VS - In cultuur sinds 1744, Engeland - Iteaceae

J

Juglans nigra - Zwarte walnoot / Bitternoot - mei - Midden en oosten van de VS - In cultuur sinds 1629, Engeland - Juglandaceae

Juglans regia - Okkernoot / Walnoot - april - mei - Zuidoosten van Europa, midden van Azië - Lang in cultuur - Juglandaceae

Juniperus communis - Gewone jeneverbes - april - Noordelijk halfrond - Lang in cultuur - Cupressaceae

Juniperus communis 'Hibernica' - Gewone jeneverbes - april - Cultivar, in cultuur sinds 1636, Engeland - (De soort: noordelijk halfrond) - Cupressaceae

Juniperus chinensis 'Blaauw' - Chinese jeneverbes - voorjaar - Cultivar, ingevoerd +- 1924, Nederland - (De soort: China) - Cupressaceae

Juniperus sabina - Zevenboom - voorjaar - Midden van Europa, Middellandse Zee, Siberië - In Cultuur sinds de Oudheid - Cupressaceae

Juniperus virginiana ('Grey Owl') - Jeneverbes - voorjaar - Cultivar, ontstaan in 1938, Nederland - (de soort: oosten van Noord-Amerika) - Cupressaceae

Juniperus x media 'Pfitzeriana' - Jeneverbes - (*J. sabina* x *J. chinensis*) - voorjaar - Cultivar, 1e vermelding 1899, Duitsland - Cupressaceae

K

Kerria japonica - Ranonkelstruik - mei - juni - Ingevoerd rond 1700 uit Japan - Rosaceae

Koelreuteria paniculata - Lampionboom - juli - augustus - Oosten van Azië - Ingevoerd rond 1750, Frankrijk - Sapindaceae

Kolkwitzia amabilis - mei - juni - China - Ingevoerd in 1901, Engeland - Linnaeaceae

Kruisbes - *Ribes uva-crispa* - april - mei - Europa, Middellandse Zee - In cultuur sinds +- 1500 - Grossulariaceae

L

Laburnum alpinum - Goudenregen - juni - Midden en zuiden van Europa - In cultuur sinds 1596, Engeland - Fabaceae

Laburnum anagyroides - Goudenregen - mei - juni - Midden en zuiden van Europa - In cultuur sinds 1560, Duitsland - Fabaceae

Laburnum x watereri - Goudenregen - (*L. alpinum* x *L. anagyroides*) - juni - Ontstaan rond 1840, Engeland - Fabaceae

Larix siberica - Siberische lariks - voorjaar - Noordoosten van Europa, Siberië - Ingevoerd in 1806, Engeland - Pinaceae

Ligustrum obtusifolium - Liguster - juni - juli - Japan - Ingevoerd in 1856, Nederland - Oleaceae

Ligustrum obtusifolium var. *regelianum* - Liguster - juni - juli - China - Ingevoerd in 1885, Frankrijk - Oleaceae

Ligustrum ovalifolium - Haagliguster - juni - juli - Japan - Ingevoerd in 1843, Nederland - Oleaceae

Ligustrum quihoui - Liguster - juli - september - China - Ingevoerd in 1908, Frankrijk - Oleaceae

Ligustrum vulgare - Gewone liguster - juni - juli - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Oleaceae

Liquidamber styraciflua - Amberboom - april - mei - Oosten en midden van de VS, Mexico - Ingevoerd in 1640, Nederland - Altingiaceae

Liriodendron tulipifera - Tulpenboom - juni - Oosten van de VS - In cultuur rond 1663, Engeland - Magnoliaceae

Lonicera ledebourii - Kamperfoelie - juni - juli - Californië - Ingevoerd in 1838, Engeland - Caprifoliaceae

Lonicera maackii - Kamperfoelie - mei - juni - Mantsjoerije, Korea - Ingevoerd rond 1860, Rusland - Caprifoliaceae

Lonicera morrowii - Kamperfoelie - mei - juni - Japan - Ingevoerd rond 1875 - Caprifoliaceae

Lonicera periclymenum - Boskamperfoelie - juni - augustus - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Caprifoliaceae

Lonicera tatarica - Kamperfoelie - mei - juni - Zuiden van Rusland, Altaigebergte - In cultuur sinds 1752, Engeland - Caprifoliaceae

Lonicera xylosteum - Kamperfoelie - mei - juni - Europa, Middellandse Zee, Midden van Azië - Lang in cultuur - Caprifoliaceae

M

Magnolia kobus - Beverboom - april - mei - Japan - Ingevoerd in 1865, VS - Magnoliaceae

Magnolia stellata - Beverboom (Stermagnolia) - maart - april - Japan - Ingevoerd 1862, VS - Magnoliaceae

Mahonia x wagneri 'Pinnacle' - (M. x aquifolium x M. pinnata) - maart - april - In cultuur sinds 1930, Nederland - Berberidaceae

Malus (domestica) - Appel - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

Malus (toringo) - Appel - mei - Japan - Ingevoerd in 1845, Nederland - Rosaceae

Malus floribunda - Appel - mei - Japan - Ingevoerd in 1856, Nederland - Rosaceae

Malus toringo 'Rosea' - Appel - mei - Cultivar, ingevoerd in 1845, Nederland - (De soort: Japan) - Rosaceae

Mespilus germanica - Mispel - mei - Westen van Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

Metasequoia glyptostroboides - Chinese moerascipres - voorjaar - Zuiden en westen van China - In cultuur sinds 1947, Engeland en VS - Cupressaceae

Morus alba - Witte moerbeï - mei - China - In cultuur sinds de Oudheid - Moraceae

Myrica gale - Gewone gagel - maart - april - Noordelijk halfmond - In cultuur sinds 1600, Nederland - Myricaceae

Myrica pennsylvanica - Wasgagel - april - mei - Oosten van Noord-Amerika - Ingevoerd rond 1725, Engeland - Myricaceae

N

Nothofagus antarctica - Schijnbeuk - voorjaar - Zuiden van Zuid-Amerika - Ingevoerd in 1840, Engeland - Nothofagaceae

O

Ostrya carpinifolia - Haagbeukbladige hopbeuk - april - mei - Middellandse Zee - In cultuur sinds 1724, Engeland - Betulaceae

P

- Parrotia persica* - (IJzerhout) - (bezemvorm) - maart - Iran - Ingevoerd in 1840, Engeland - Hamamelidaceae
- Parrotia persica* - (IJzerhout) - maart - Iran - Ingevoerd in 1840, Engeland - Hamamelidaceae
- Paulownia tomentosa* - maart - mei - China - Ingevoerd in 1834, Frankrijk - Paulowniaceae
- Philadelphus (pubescens)* - Boerenjasmijn - juni - juli - Zuidoosten van de VS - In cultuur sinds 1800, Engeland - Hydrangeaceae
- Philadelphus ('Virginal')* - Boerenjasmijn - (Virginalisgroep) - juni - Ontstaan voor 1909 - Hydrangeaceae
- Philadelphus coronarius* - mei - juni - Europa, Kaukasus - In cultuur 1573, Oostenrijk - Hydrangeaceae
- Phillyrea vilmoriniana* - Steenlinde - mei - Westen van Azië - Ingevoerd in 1866, Frankrijk - Oleaceae
- Photinia villosa* - (Glansmispel) - mei - juni - Oosten van Azië - Ingevoerd in 1862, Nederland - Rosaceae
- Physocarpus opulifolius* - Blaasspiraea - juni - juli - Noordoosten van Noord-Amerika - In cultuur rond 1690, Nederland - Rosaceae
- Picea abies* - Fijnspar / Kerstspaar - mei - Europa - Lang in cultuur - Pinaceae
- Picea omorika* - Servische spar - mei - Westen van de Balkan - Ingevoerd in 1880, Duitsland - Pinaceae
- Picea pungens* - Sierspar - mei - Westen van de VS - Ingevoerd in 1863, Engeland - Pinaceae
- Pinus nigra* - Zwarte den - mei - juni - Midden en zuiden van Europa, Klein-Azië - Ingevoerd in 1759, Engeland - Pinaceae
- Pinus nigra subsp. laricio var. maritima* - Corsicaanse den - mei - juni - Corsica, zuiden van Italië - Ingevoerd in 1788, Engeland - Pinaceae
- Pinus nigra subsp. nigra* - Oostenrijkse den - mei - juni - Zuidoosten van Europa - Ingevoerd in 1835, Engeland - Pinaceae
- Pinus pinaster* - Zeeden - juni - Westen van de Middellandse Zee - Lang in cultuur - Pinaceae
- Pinus strobus* - Weymouthden - mei - juni - Midden en oosten van Noord-Amerika - In cultuur sinds 16e eeuw, Frankrijk - Pinaceae
- Pinus sylvestris* - Grove den - mei - juni - Europa, noorden van Azië - Lang in cultuur - Pinaceae
- Platanus orientalis* - Oosterse plataan - april - mei - Oriënt - In cultuur 1548, Engeland - Platanaceae
- Platanus x hispanica* - Gewone plataan - (*P. occidentalis* x *P. orientalis*) - april - mei - Ontstaan rond 1670, Engeland - Platanaceae
- Populus deltoides* - Amerikaanse populier - maart - april - Midden van Noord-Amerika - Ingevoerd rond 1750, Frankrijk - Salicaceae
- Populus lasiocarpa* - Populier - maart - april - Midden en westen van China - Ingevoerd in 1904, Engeland - Salicaceae
- Populus tremula* - Ratelpopulier / Esp - maart - april - Europa, Azië, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Salicaceae
- Populus x canadensis* - Canadese populier - (*P. deltoides* - *P. nigra*) - april - Cultivar, ontstaan rond 1750, Frankrijk - Salicaceae

Populus x canadensis ('Serotina') - Canadese populier - (*P. deltoides* x *P. nigra*) - april - mei - Cultivar, ontstaan +- 1750, Frankrijk - Salicaceae

Populus x canescens - Grauwe abeel - (*P. alba* x *P. tremula*) - maart - april - Lang in cultuur - Salicaceae

Potentilla fruticosa - Ganzerik - mei - september - Europa, Noord-Azië, China - Lang in cultuur - Rosaceae

Prunus avium - Zoete kers / Kriek - april - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

Prunus cerasifera - Kerspruim - april - Balkan, westen van Azië - In cultuur sinds 1594, Nederland - Rosaceae

Prunus cerasifera 'Nigra' - Kerspruim - april - Cultivar, sinds 1916, VS - (De soort: Balkan, westen van Azië) - Rosaceae

Prunus laurocerasus - Gewone laurierkers - mei - Balkan, Klein-Azië - Ingevoerd in 1558, Italië - Rosaceae

Prunus mahaleb - Weichselboom - april - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

Prunus padus - Vogelkers - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

Prunus serrula - Sierkers - april - Westen van China - Ingevoerd in 1908, Engeland - Rosaceae

Prunus serrulata - Japanse sierkers - cultivar - april – mei - Japan - Ingevoerd in 1819, Engeland - Rosaceae

Prunus spinosa - Sleedoorn - maart - april - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Rosaceae

Prunus subhirtella 'Autumnalis' - Sierkers - april - mei - Japan - Ingevoerd in 1894, VS - Rosaceae

Prunus x amygdalopersica - (*P. dulcis* x *P. persica*) - maart - april - In cultuur sinds 1623, Zwitserland - Rosaceae

Pseudosasa japonica - Bamboe - Japan - Ingevoerd in 1850, Europa - Poaceae

Pseudotsuga menziesii - Douglasspar - mei - Westen van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1827, Engeland - Pinaceae

Pterocarya fraxinifolia - Gewone vleugelnoot / Kaukasische vleugelnoot - mei - Kaukasus / Oriënt - Ingevoerd in 1782, Engeland - Juglandaceae

Pyrus communis - Peer - april - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

Pyrus salicifolia 'Pendula' - Peer (Wilgbladige peer) - april - mei - Cultivar, ingevoerd in 1780, Engeland - (De soort: Balkan, westen van Azië) - Rosaceae

Q

Quercus castaneifolia - Eik - mei - Oosten van de Middellandse Zee, Voor-Azië, Kaukasus - Ingevoerd rond 1858, Nederland - Fagaceae

Quercus cerris - Moseik / Turkse eik - mei - Oosten van de Middellandse Zee - In cultuur sinds 1735, Engeland - Fagaceae

Quercus palustris - Moereseik - mei - Noordoosten van de VS - In cultuur sinds 1770, Duitsland - Fagaceae

Quercus petraea - Wintereik - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Fagaceae

Quercus petraea 'Mespilifolia' - Wintereik - mei - Cultivar, ontstaan rond 1843 in Frankrijk - (De soort: Europa, westen van Azië) - Fagaceae

Quercus robur - Zomereik - april - mei - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Fagaceae

Quercus rubra - Amerikaanse eik - mei - Midden en oosten van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1724, Engeland - Fagaceae

R

Rhamnus cathartica - Wegedoorn - mei - juni - Europa tot Noord-Azië - Lang in cultuur - Rhamnaceae

Rhodotypos scandens - Kaimastruik - mei - juli - China, Japan - Ingevoerd in 1860, Nederland - Rosaceae

Rhus typhina - Fluweelboom - juni - juli - Midden en oosten van Noord-Amerika - In cultuur sinds 1622, Frankrijk - Anacardiaceae

Ribes alpinum - Alpenbes - juni - Europa - Lang in cultuur - Grossulariaceae

Ribes americanum - Bes - april - mei - Midden en oosten van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1729, Engeland - Grossulariaceae

Ribes aureum - Gele alpenbes - april - mei - Westen en midden van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1812, Engeland - Grossulariaceae

Ribes sanguineum - Bes - april - mei - Noordwesten van de VS - Ingevoerd in 1836, Engeland - Grossulariaceae

Ribes uva-crispa - Kruisbes - april - mei - Europa, Middellandse Zee - In cultuur rond 1500 - Grossulariaceae

Robinia pseudoacacia - Gewone acacia - juni - Midden en oosten van de VS - Ingevoerd in 1601, Frankrijk - Fabaceae

Rosa (rubiginosa) - (Egelantier) - juni - juli - Europa - In cultuur sinds 1594, Nederland - Rosaceae

Rosa canina - Hondсроos - juni - juli - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Rosaceae

Rosa centifolia - Honderdbladige roos - juni - juli - Kaukasus - In cultuur sinds de Oudheid - Rosaceae

Rosa glauca - Bergroos - juni - juli - Midden en zuiden van Europa - In cultuur sinds 1818, Nederland - Rosaceae

Rosa moyesii - Roos - juni - juli - Westen van China - Ingevoerd in 1903, Engeland - Rosaceae

Rosa multiflora - Veelbloemige roos / Trosroos - juni - augustus - Japan, Korea - Ingevoerd in 1804, Engeland - Rosaceae

Rosa nitida - Roos - juni - juli - Oosten van Canada, noordoosten van de VS - Ingevoerd in 1807, Engeland - Rosaceae

Rosa omeiensis 'Pteracantha' - Roos - mei - juni - Ingevoerd in 1901, Engeland - (De soort: westen van China) - Rosaceae

Rosa pimpinellifolia - Duinroos - mei - juni - Europa, Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

Rosa rugosa - Japanse bottelroos / Rimpelroos - mei - augustus - Oosten van Azië - Ingevoerd rond 1796, Engeland - Rosaceae

Rosa x alba - Roos - (*R. corymbifera* x *R. gallica*) - juni - In cultuur sinds 1597, Engeland - Rosaceae

Rosa xanthina f. *hugonis* - Roos - mei - juni - Oosten van Azië (cultuur) - Ingevoerd in 1899, VS - Rosaceae

Rubus idaeus - Framboos - mei - augustus - Noordelijk halfrond - Sinds lang in cultuur - Rosaceae

Rubus odoratus - Braam - juli - augustus - Midden en oosten van Noord-Amerika - In cultuur sinds 1635, Frankrijk - Rosaceae

Rubus phoenicolasius - Japanse wijnbes - juni - juli - Oosten van Azië - Ingevoerd 1876, Frankrijk - Rosaceae

Rubus spectabilis - Prachtframboos - maart - april - Westen van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1827, Engeland - Rosaceae

S

- Salix* (x *smithiana*) - Wilg - (*S. caprea* x *S. viminalis*) - april - mei - In cultuur sinds 1808, Duitsland - Salicaceae
- Salix alba* - Schietwilg - mei - Europa, Middellandse Zee, noorden van Azië - Lang in cultuur - Salicaceae
- Salix aurita* - Geoorde wilg - maart - april - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Salicaceae
- Salix caprea* - Waterwilg - maart - april - Europa, noorden van Azië - Lang in cultuur - Salicaceae
- Salix cinerea* - Grauwe wilg - maart - april - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Salicaceae
- Salix elaeagnos* - Grize wilg - april - mei - Midden en zuiden van Europa, Klein-Azië - In cultuur sinds 1762, Frankrijk - Salicaceae
- Salix fragilis* - Kraakwilg - april - mei - Europa, West-Azië - Lang in cultuur - Salicaceae
- Salix purpurea* - Bittere wilg - maart - april - Europa, noorden van Azië, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Salicaceae
- Salix viminalis* - Katwilg - maart - april - Europa, noorden van Azië - Lang in cultuur - Salicaceae
- Salix x sepulcralis* 'Chrysocoma' - Treurwilg - (*Salix alba* x *Salix babylonica*) - april - mei - Cultivar, ontstaan rond 1815, Frankrijk - Salicaceae
- Sambucus nigra* - Gewone vlier - mei - juni - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Adoxaceae
- Sequoiadendron giganteum* - Mammoetboom / Reuzensequoia - mei - Californië - Ingevoerd in 1853, Engeland - Cupressaceae
- Sorbaria* (*sorbifolia*) - Lijsterbesspiraea - juni - augustus - Azië - In cultuur sinds 1759, Engeland - Rosaceae
- Sorbus americana* - Lijsterbes - mei - Midden en oosten van Noord-Amerika - In cultuur sinds 1809, Duitsland - Rosaceae
- Sorbus aucuparia* - Wilde lijsterbes - mei - Europa, Siberië - Lang in cultuur - Rosaceae
- Sorbus intermedia* - Lijsterbes - mei - Zuiden van Scandinavië, zuiden van de Oostzeekust - Lang in cultuur - Rosaceae
- Spiraea* (*decumbens*) - juni - Zuidoosten van de Alpen - In cultuur sinds 1830, Duitsland - Rosaceae
- Spiraea* (x *arguta*) - (*S. multiflora* x *S. thunbergii*) - mei - Ontstaan +- 1884, Duitsland - Rosaceae
- Spiraea nipponica* - mei - juni - Japan - Ingevoerd in 1870, Nederland - Rosaceae
- Spiraea thunbergii* - Thunbergspirea - april - mei - China, Japan - Ingevoerd in 1859, Nederland - Rosaceae
- Spiraea trichocarpa* - juni - Korea - Ingevoerd in 1920 - Rosaceae
- Spiraea x billiardii* - (*S. douglasii* x *S. salicifolia*) - juli - september - Ontstaan rond 1854, Frankrijk - Rosaceae
- Spiraea x vanhouttei* - (*S. cantoniensis* x *S. trilobata*) - mei - juni - Ontstaan rond 1862, Frankrijk - Rosaceae
- Stephanandra incisa* - juni - juli - Japan, Korea - Ingevoerd rond 1872, Rusland - Rosaceae
- Stephanandra tanakae* - juni - juli - Japan - Ingevoerd in 1893, Engeland - Rosaceae
- Styphnolobium japonicum* - Honingboom - augustus - september - China, Korea - Ingevoerd rond 1750, Frankrijk - Fabaceae
- Symphoricarpos albus* var. *laevigatus* - Sneeuwbes - juli - september - Oosten van Canada, noorden van de VS - Ingevoerd in 1817, Engeland - Caprifoliaceae

Symphoricarpos orbiculatus - juli - september - Midden en oosten van de VS - In cultuur sinds 1730, Engeland - Salicaceae

Syringa josikaea - Hongaarse sering - mei - juni - Karpaten - Ingevoerd in 1830, Oostenrijk - Oleaceae

Syringa reflexa - Sering - juni - Midden van China - Ingevoerd in 1910, VS - Oleaceae

Syringa vulgaris - Gewone sering - mei - Midden en zuidoosten van Europa - In cultuur sinds 1554, Italië - Oleaceae

Syringa x persica - Perzische sering - (*S. vulgaris* x *S. laciniata*) - juni - In cultuur sinds 1640, Engeland - Oleaceae

T

Tamarix tetrandra - Tamarisk - april - mei - Oosten van de Middellandse Zee - Ingevoerd in 1821 - Tamaricaceae

Taxodium distichum - Moerascipres - mei - Zuiden en zuidoosten van de VS - In cultuur sinds 1640, Engeland - Cupressaceae

Taxus baccata - Gewone taxus - maart - april - Europa, Middellandse Zee - In cultuur sinds de Oudheid - Taxaceae

Taxus baccata 'Repandens' - Gewone taxus - maart - april - Cultivar, sinds 1887, Engeland - (De soort: Europa, Middellandse Zee) - Taxaceae

Thuja occidentalis - Westerse levensboom - maart - april - Oosten van Noord-Amerika - Ingevoerd - waarschijnlijk in 1534, Frankrijk - Cupressaceae

Thuja plicata - Reuzenlevensboom - april - Westen van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1853, Engeland - Cupressaceae

Tilia americana - Amerikaanse linde - juli - Midden-Amerika, Noord-Amerika - In cultuur sinds 1752, Engeland - Malvaceae

Tilia cordata - Winterlinde / Kleinbladige linde - juni - Europa - Lang in cultuur - Malvaceae

Tilia platyphyllos - Zomerlinde / Grootbladige linde - mei - juni - Europa - Lang in cultuur - Malvaceae

Tilia tomentosa 'Pendula' - Zilverlinde - juli - Cultivar, sinds 1767, Engeland - (De soort: Zuidoosten van Europa, Klein-Azië) - Malvaceae

Tilia x europaea 'Euchlora' - Krimlinde - (*T. cordata* x *T. platyphyllos*) - juni - Cultivar, in cultuur voor 1950, Duitsland - Malvaceae

Tilia x europaea 'Koningslinde' - Hollandse linde - (*T. cordata* x *T. platyphyllos*) - juni - Introductie 1945, Nederland - Malvaceae

U

Ulmus 'Columella' - Iep - ((*U. glabra* 'Exoniensis' x *U. wallichiana*) x (*U. minor* nr. 1 x *U. minor* nr. 28)) - maart - april - Introductie 1989, Nederland - Ulmaceae

Ulmus glabra 'Exoniensis' - Pluimiep - februari - maart - Cultivar, ontstaan rond 1826, Engeland - (De soort: Europa) - Ulmaceae

Ulmus laevis - Iep (Fladderiep, Steeliep) - februari - maart - Midden van Europa, westen van Azië - In cultuur sinds 1800, Duitsland - Ulmaceae

Ulmus minor - Veldiep - februari - maart - Europa, Middellandse Zee - In cultuur sinds 1633, Engeland - Ulmaceae

Ulmus procera - Engelse veldiep - februari - maart - Engeland, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Ulmaceae

Ulmus x hollandica - Iep - (U. carpinifolia x U. glabra) - maart - april - Lang in cultuur - Ulmaceae

Ulmus x hollandica 'Commelin' - Iep - (U. carpinifolia x U. glabra) - maart - april - Cultivar, ontstaan +- 1950, Nederland - Ulmaceae

V

Viburnum carlesii - april - mei - Korea - Ingevoerd in 1885, Japan - Adoxaceae

Viburnum farreri - (november -) februari - april - Noorden van China - Ingevoerd in 1911, Engeland - Adoxaceae

Viburnum lantana - Wollige sneeuwbal - mei - juni - Europa, Middellandse Zee - In cultuur sinds 1594, Nederland - Adoxaceae

Viburnum opulus - Gelderse roos - mei - juni - Europa, Middellandse Zee, noorden van Azië - Lang in cultuur - Adoxaceae

Viburnum rhytidophyllum - mei - juni - Midden en westen van China - Ingevoerd in 1900, Engeland - Adoxaceae

Viburnum x burkwoodii - (V. carlesii x V. utile) - april - mei - Ontstaan in 1824, Engeland - Adoxaceae

Vlinderstruik - Buddleja davidii - juli - september - China - ingevoerd in 1893, Frankrijk - Scrophulariaceae

Vlinderstruik - Buddleja davidii ('Camkeep') - augustus - september - Cultivar, ontstaan in Engeland - (De soort: China, ingevoerd in 1893, Frankrijk) - Scrophulariaceae

W

Weigela florida - mei - juli - Noorden van China, Korea - Ingevoerd in 1844, Engeland - Diervillaceae

Weigela japonica ('Bristol Ruby') - mei - juni - Cultivar, ontstaan +- 1946, VS - (De soort: Japan) - Diervillaceae

X

x Cuprocyparis leylandii - (Xanthocyparis nootkatensis x Cupressus macrocarpa) - maart - april - Ontstaan rond 1888, Engeland - Cupressaceae

x Mahoberberis neubertii - (Mahonia aquifolium x Berberis vulgaris) - voorjaar - Ontstaan rond 1850, Frankrijk - Berberidaceae

Xanthocyparis nootkatensis 'Pendula' - maart - april - Westen van Canada, noordwesten van de VS - Ingevoerd rond 1850, Rusland - Cupressaceae